

Injections : vérifier le médicament et le contexte

Éviter qu'une préparation correcte soit administrée au mauvais patient, par la mauvaise voie ou dans un contexte inadapté.

Public : Professionnels habilités ; étudiants uniquement sous supervision

Support indépendant pour préparer et réviser. Ni habilitation ni protocole institutionnel approuvé. Pour un geste réel : compétence validée, prescription, supervision et procédure locale à jour.

1. Vérifier la décision

Lire une prescription complète, actuelle et compréhensible. Contrôler identité, allergies, indication, voie, horaire et paramètres requis. Une abréviation ambiguë ou une dose illisible doit être clarifiée avant la préparation.

2. Recalculer avec les unités

Séparer la dose prescrite de la concentration disponible. Pour l'entraînement : $\text{volume en mL} = \text{dose en mg} \div \text{concentration en mg/mL}$. Exemple abstrait : $12 \text{ mg} \div 6 \text{ mg/mL} = 2 \text{ mL}$. Cet exemple de calcul n'est la prescription d'aucun médicament et ne valide aucune voie d'administration.

3. Consulter la bonne référence

Lire la notice et le guide institutionnel pour dilution, compatibilité, stabilité, vitesse et matériel. Les modalités IM, SC et IV ne sont pas interchangeables. Une vérification indépendante est appliquée aux produits et situations définis par l'établissement.

4. Préparer et administrer dans son rôle

Utiliser une préparation aseptique, identifier immédiatement toute seringue préparée et garder la prescription accessible. Le site anatomique, l'aiguille et la technique sont appris et validés en pratique supervisée, selon la personne, le produit et la voie.

5. Surveiller et tracer

Vérifier effet attendu, tolérance locale et générale, puis documenter l'administration réelle ou la non-administration et sa raison. Une réaction inhabituelle impose une évaluation ; un traitement préparé n'est jamais marqué comme donné avant l'administration.

Quand interrompre et alerter

Discordance de dose ou de voie, produit non identifié, incompatibilité non résolue, allergie suspectée : suspendre et faire clarifier. Détresse respiratoire ou circulatoire après injection : activer immédiatement l'alerte du lieu de soins.

Traçabilité

Produit ; dose ; voie ; heure ; site si pertinent ; contrôles requis ; effet ; événement indésirable ; action et alerte.

Cas fictif : entraînez votre raisonnement

Une seringue sans étiquette est posée près d'une prescription. Votre collègue est momentanément absent. Peut-on la reconnaître à sa couleur ?

Correction argumentée

Non. Ne pas l'administrer. Faire appliquer la procédure locale de gestion d'un produit non identifié. Repréparer si nécessaire à partir d'une prescription vérifiée. La proximité d'un document ne prouve pas le contenu.

Références

OMS : programme multiprofessionnel de sécurité des patients

<https://www.who.int/publications/i/item/9789241501958>

HUG : référentiel des procédures médico-soignantes

<https://www.hug.ch/procedures-medico-soignantes>